

# Семейство Порови (*Mustelidae*)

(пълното наименование на видовете тук - <http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12100>)

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.

Автор: Константин Йорданов

Поровете (**Mustelidae**) са най-голямото и най-разнообразното семейство от разред Хищници. Класификацията му все още е обект на немалко научни полемики и на сериозни таксономични размествания. Последните ДНК-изследванията отделиха Скунксовете (*Coneratus*, *Mephitis* и *Spilogale*) и миризливите язовци (*Mydas*) в изцяло новото семейство *Mephitidae*, а останалите Порове бяха разделени на цели 8 подсемейства от 2 през 2005 г. (MSW3ed). Молекулярният часовник показва общ предшественик преди 15 млн. г., като на някой от най-редките видове, като Колумбийска невестулка (*Mustela felipei*), Нилгирийската златка (*Martes gwatkinsii*) и Индонезийската планинска невестулка (*Mustela lutreolina*), все още не са проведени генетични тестове. *Mustelidae* включва 22 рода, 57 вида и общо 217 съвременни подвида. 7 вида са Застрашени, 5 са Уязвими, а 1 вид е изчезнал от 1600 г. насам. Срещат се почти по-цялото земно кълбо, с изключение на Австралия и Антарктида, като обитават равнинни местности, гори, тундри и морски брегове от Арктика до тропиците. Размерите им варират от най-малкия хищен бозайник, Същинската невестулка-*Mustela nivalis* (25 г.) до Морската видра (*Enhydra lutris*) достигаща до 45 кг. Въпреки, че някои видове прибавят плодове и ядки към менюто си, *Mustelidae* са основно месоядни животни и отлични ловци. Свирепата Росомаха (*Gulo gulo*), например тежаща 18-20 кг, поваля, няколко пъти по-едрия Северен елен (*Rangifer tarandus*). Успява да го настигне, мята се на гърба му, с помощта на здравите си нокти се

добира до главата и прекършва гърлото му с мощните си зъби. Заради нападенията си над добитъка и заради изключително ценната си и здрава кожа, Поровете са избивани повсеместно от нас хората. Не случайно, вече сме успели да заличим Морската норка (*Neovison macrodon*) от лицето на земята. Представям ви последната систематика и ако някой има забележки към българските имена, а и към каквото и да било, нека даде предложение. Приел съм двете думи от английски *Ferret* и *Polecat*, да се превеждат, като Пор, а *Marten* като Златка. По принцип предпочитам да запазвам единичните имена, дори да са преводими.



Разред: *Carnivora*

Подразред: *Caniformia*

Семейство: *Mustelidae*

Подсемейство: *Taxidinae*

Род: *Taxidea*

Американски язовец (*Taxidea taxus*)



Медояд - (*Mellivora capensis*)



Свиневиден язовец (*Arctonyx collaris*)



Японски язовец (*Meles anakita*)



Азиатски язовец (*Meles leucurus*)



Европейски язовец (*Meles meles*)-среща се в България





Тайра (*Eira barbara*)



Росомаха (*Gulo gulo*)



Американска златка (*Martes americana*)

Японска златка (*Martes melampus*)



Нилгирийската златка (*Martes gwatkinsii*)



Жълтогръда златка (*Martes flavivula*)



Евразийска златка (*Martes martes*)- среща се в България



Белка (*Martes foina*) - среща се в България

Фишър (*Martes pennanti*)



Самур (*Martes zibellina*)



Язовец на Еверет (*Melogale everetti*)



Китайски язовец (*Melogale moschata*)



Бирмански язовец (*Melogale personata*)



Явански язовец (*Melogale orientalis*)



Малък Гризон (*Galictis cuja*)





Голям Гризон (*Galictis vittata*)



Пъстър нор (*Martes martes*) -  
среща се в България



Северноафрикански ивичест нор (*Ictonyx libycus*)



Зорила (*Ictonyx striatus*)

Може да видите  
всички видове  
във форума на сп.  
“Българска Наука”

<http://goo.gl/iGSAK>