

# Влечугите в България

В предните няколко броя изчерпахме българските видове змии. Не виждам по - подходящ преход към следващата част на темата от представителите на "Безкраките гущери". В България се срещат два вида от тези влечуги: слепока и змиегущера

Автор: Марко Иванов

<http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440>

**Ливадният гущер /*Lacerta agilis*/**, е вид средно голям гущер, разпространен в големи части от Евразия. Той достига на дължина 25 cm, има светъл корем и тъмна ивица по гърба. Мъжките са по-тъмни на цвят, а през размножителния период стават ярко зелени. Има няколко подвида, които значително се различават по окраската си.



Ливадният гущер се среща в обширна област от умерения пояс на Азия и Европа. На запад ареалът му достига до Централна Франция и южната половина на Великобритания, на север - до Южна Швеция и района на Санкт Петербург, на изток - до Байкал и западните области на Китай, а на юг - до Алпите, средните части на Балканския полуостров, Кавказ и северните брегове на Каспийско море, Аралско море и Балхаш.



В България ливадният гущер се среща главно в западните части на страната, до надморска височина 2200 m. Ливадните гущери от Западна България вероятно са от подвида *L. a. bosnica*. Има тяхна популация и в Добруджа и по североизточното черноморско крайбрежие. Извън тези места, в Източна България се срещат само отделни екземпляри.

Ливадният гущер е активен главно през деня. Крие се под камъни и пънове и в дупки на гризачи, като и сам прокопава тунели. Храни се с едри насекоми, най-често - скакалци. През юни-август снася от 4 до 8 (рядко до 15) яйца, а малките се излюпват след 55-65 дни.

### Горският гущер /*Lacerta praticola*/

е гущер, срещащ се на Балканите и в района на Кавказ. На Балканския полуостров и в Северозападен Кавказ е разпространен подвида *L. p. pontica*, а в останалата част от ареала - *L. p. praticola*.



В България се среща в изолирани находища около Видин, Белоградчик, Трън, Червен бряг, Костенец, както и в Североизточна България и Странджа.

Този вид предпочита да живее в дъбови гори, в които има поляни с рядка трева и опадали листа. У нас се среща до надморска височина 600 m. Достига до 15 cm. дължина. Храни се главно с дребни насекоми. През юни снася 2-6 овални яйца с размер около 11 mm, а малките се излюпват около 55 дни по-късно.



### Ивичестият гушер /*Lacerta trilineata*/

е средно голям гушер, разпространен в южните, източни и крайбрежни части на Балканския полуостров и в Западна Мала Азия. В България се среща в Дунавската равнина на изток от Плевен, по Черноморието, в Горнотракийската низина и по долината на Струма на юг от Кресна. По Черноморието е разпространен подвидът *L. t. dobrogica*, а в останалата част от страната - *L. t. trilineata*.



Ивичестият гушер предпочита сухи тревисти склонове, където се крие под камъни и храсти, в дупки на гризачи и други. Активен е през деня и се храни с насекоми, охлюви, паякообразни, по-рядко и с дребни гущери. Снася по 5-12 яйца, понякога по два пъти годишно. Малките и възрастните женски имат пет добре очертани светлозелени ивици по дължината на гърба си, докато възрастните мъжки са изцяло зелени и приличат на големи зелени гущери /*Lacerta viridis*/.

карта на разпространение

