

БИОЛОГИЯ

Влечугите в България

В предните няколко броя изчерпахме българските видове змии. Не виждам по - подходящ преход към следващата част на темата от представителите на "Безкраките гущери". В България се срещата два вида от тези влечуги: слепока и змиегущера

Автор: Марко Иванов

<http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440>

Балканският гекон /*Cyrtopodion kotschyi*/ , наричан също и нощен гущер, е вид гущер.



Той е единственият представител на семейство Гекониви /Gekkonidae/, срещащ се в България.

Балканският гекон е разпространен в южната част на Апенинския полуостров, южните и източни части на Балканския полуостров, по островите в Източното Средиземноморие, в южните части на Крим, западните части на Грузия и Армения, средните и южни области на Турция, в Сирия и Палестина. В България се среща до 450 мнв, като са представени три подвида:



S. k. ritelicus - около Пазарджик, Пловдив и Асеновград

Балканският гекон е предимно синантропен вид - живее най-вече в селищата.

Той е активен през нощта, като през деня се крие в пукнатини, покриви, и други части на сградите. Добре се катери по гладки повърхности и рядко слиза на земята. Храни се с насекоми и дребни паякообразни. Женските снасят най-често по две яйца в началото на лятото.

S. k. bibroni - в Петричко-Санданската котловина



S. k. danilewskii - в Югоизточна България и по Черноморието до Варна на север

Късокракият гуцер /*Ablepharus kitaibelii*/ е вид дребен гуцер от семейство Сцинкови (*Scincidae*), разпространен в

Югоизточна Европа и Близкия Изток, включително и в България. Достига дължина около 15 cm. Краката му са къси и при нужда от бързо придвижване ги притиска към тялото си и се движи като змия с извивки на цялото тяло. На цвят е медночервен, по-тъмен от страни. Клепачите са неподвижни.



Късокракият гушер предпочита сухи слънчеви тревисти местности с редки храсти или дървета. Активен по здрач, когато лови насекоми, паякообразни и дребни охлюви. Живее главно на земята и не обича да се катери. При сухо и горещо време се крие под камъни и опадали листа.

Женските снасят по 2 до 4 яйца с диаметър около 5 mm.

Късокракият гушер се среща в по-голямата част от Балканския полуостров до Босна на запад и южните части на Румъния на север. Разпространен е и по островите в Източното Средиземноморие и Близкия Изток от Синайския полуостров до Сирия и Армения. Среща се и в област в Унгария и Южна Словакия, изолирана от останалия ареал. В България е разпространен в отделни откъснати популации в по-голямата част от страната до към 1100 мнв.



Карта на разпространение ->